




ТУБЕРКУЛЕЗ – тяжелая инфекционная болезнь, которая передается воздушно – капельным путем (при вдыхании воздуха, в котором находятся возбудители туберкулеза.) Болезнь обычно поражает ткань легких, реже затрагивая другие органы. При раннем выявлении туберкулеза и прохождении полного курса лечения больные люди быстро становятся незаразными и в конечном итоге излечиваются.

Основные симптомы туберкулеза:



кашель
на протяжении
2–3 недель



потливость
по ночам



боль в груди



периодическое
повышение
температуры



значительное
похудение,
потеря веса



общее
недомогание
и слабость



наличие крови
в мокроте

При наличии кашля и других перечисленных признаков
в течении 2-х недель и более,
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Основная профилактика туберкулеза - **ВАКЦИНАЦИЯ**

Вакцина БЦЖ. Вакцинацию проводят в соответствии с календарем профилактических прививок. Первую прививку проводят еще в роддоме в первые 3–7 дней жизни новорожденного. В 7 и 14 лет при отсутствии противопоказаний, отрицательной реакции Манту проводят ревакцинацию.



Важное значение для раннего выявления заболевания **ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.** Всему взрослому населению, с целью выявления туберкулеза на ранних стадиях, не реже одного раза в год необходимо проходить.

Помните!

Туберкулез проще предупредить, чем лечить!

