




Лихорадка Эбола



Лихорадка Эбола

очень заразное вирусное инфекционное заболевание из группы геморрагических лихорадок, характеризующееся крайне тяжелым течением и высокой смертностью.

В природе человек от животных в организме которого может находится возбудитель заболевания:



Заражение человека происходит при контакте с кровью, биологическими выделениями или трупами зараженных животных. Дальнейшее распространение вируса от человека к человеку возможно при контакте с больным, проведении медицинской манипуляций инструментарием, загрязненным кровью больного, половым путем.

Больные лихорадкой Эбола представляют ВЫСОКУЮ ОПАСНОСТЬ для окружающих людей примерно В ТЕЧЕНИЕ 3-Х НЕДЕЛЬ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ, выделяя вирус со слюной, носоглоточной слизью, кровью, мочой, спермой и др.

Симптомы лихорадки Эбола



ФКУЗ Ростовский – на – Дону противочумный институт Роспотребнадзора
Лаборатория санитарной охраны территории
Составитель: Рыжова А.А.



EBOLA HEMORRHAGIC FEVER



Ebola hemorrhagic fever

a highly contagious viral disease belonging to hemorrhagic fever group and characterized by severe clinical course and high mortality rate.

In nature a person is infected through contacts with animals carrying a causative agent of the disease:



A person can get Ebola virus through contacts with blood, bodily fluids or corpses of infected animals. Further virus spread from person to person can occur through contacts with a sick person, when using instruments contaminated by the blood of infected person, or by sexual transmission.

Sick people pose GREAT DANGER for the others approximately DURING THREE WEEKS FROM THE DISEASE ONSET, as they excrete virus with saliva, nasopharyngeal mucus, blood, urina, semen etc.

Symptoms of Ebola hemorrhagic fever

