



## Лихорадка Зика




ФКУЗ Ростовский – на – Дону противочумный институт Роспотребнадзора  
Лаборатория санитарной охраны территории  
Составитель: Рыжова А.А.



## Лихорадка Зика

Это вирус, переносимый комарами. У людей вызывает одноимённое заболевание, характерными симптомами которого являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, опухание суставов.

В настоящее время вирус Зика распространён в регионах Центральной и Южной Америки (Мексика, Боливия, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор и ряд других), на островах Карибского бассейна, в странах Африки (Сенегал, Уганда, Нигерия, Габон, Танзания, Египет, ЦАР, Сьерра-Леоне и др.), Центральной, Южной (Мальдивы) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Таиланд), на островах Тихого океана.




## Лихорадка Зика можно заразиться:



*(Микроцефалия – это значительное уменьшение размеров черепа, и соответственно головного мозга при нормальных размерах других частей тела)*

***Вирус Зика наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжёлыми поражениями мозга***

## Симптомы лихорадки Зика



*Лихорадка, Сыпь на теле, Боль в суставах и мышцах, Головная боль, Непереносимость яркого света, Общие недомогания, Озноб.*  
***Специфических методов профилактики не разработано!***



## ZIKA FEVER




ФКУЗ Ростовский – на – Дону противочумный институт Роспотребнадзора  
Лаборатория санитарной охраны территории  
Составитель: Рыжова А.А.




### Zika fever

is a mosquito-borne flavivirus.  
In people causes the same disease, the characteristic symptoms of which are rash, fatigue, headache and joint pain, fever, swelling of the joints.

At present Zika virus is spread in the regions of Central and South America (Mexico, Bolivia, Brazil, Colombia, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, and several others), on the islands of the Caribbean basin, in Africa (Senegal, Uganda, Nigeria, Gabon, Tanzania, Egypt, Central African Republic, Sierra Leone, etc.), Central, South (Maldives) and Southeast Asia (Cambodia, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand), on the islands of the Pacific ocean.




### Zika fever can be transmitted



*(Microcephaly is a significant reduction in the size of the skull, and therefore the brain at normal sizes of other parts of the body)*

***Zika virus is particularly dangerous to pregnant women, as it causes the fetus microcephaly with potential severe brain damage.***

### Symptoms of Zika fever



*Fever, Rash on the body, pain in joints and muscles, Headache, Intolerance to bright light, General ailments, Chills.*

***Specific methods of prevention is not developed!***